

El Canelo (*Drimys Winteri* Forst. i *D. chilensis* D. C.) lo emplean con el mismo fin, i de la manera como al pellupellu. A falta de estas plantas baten en el agua un canasto con estiércol ovejuno en un remanso i satura da el agua produce el mismo efecto aunque con menor fuerza.

LOS INSECTOS (Insecta), cuyo nombre viene de *insecare* cortar en, dividir cortando o del griego «entomon» endentar (los segmentos); por esto la ciencia que trata de esta clase de seres se llama *Insectología* o *Entomología*; la denominacion indígena es: *Colicoli*.

La zona es escasa en jéneros, especies i variedades, comparada con el norte de Chile i con los trópicos.

Sólo enumeraré brevemente los que llaman la atencion del viajero.

*Coleópteros*: (provistos de élitros), COLEOTERA L., *Chiasognathus Grantii*, Steph. un lucánido; se parece al ciervo volante por las tijeras en forma de astas de ciervo en el macho; se le encuentra de preferencia sobre los tenoís o tíneos (*Weinmannia trichosperma*, Cav.); hai una variedad *affinis*, Ph., mucho mas pequeña i otra especie, Ch, *impubis*, Parr. *Chalcolepidius luteipennis*, Guér. un elatérico llamado *salta-pericò*; mui comun en el pasto i al pie de los troncos de árboles.

• *Brachysternus viridis*. Sol, el *pololo* o. *San Juanito*; en verano se hospedan verdaderos enjambres en el entretecho de las casas, i cubren al anochecer los manzanos; la especie *B. augustus*, Ph. es mas pequeña.

De la familia *Buprestidos* están representados los jéneros *Dactylozodes*, Chevr. i *Pithiscus*, Sol.; *saltadores*.

Entre los *longicornios* está dignamente representada la familia de los *Cerambycides* con el

*Cheloderus Childreni*, Gray, que se encuentra dentro de los coigües (*Fagus Dombeyi*, Mirb.); brilla como oro, bronce i acero bruñidos; a los lados tintes azulejos, violados. Se le encuentra de la siguiente manera en su escondite donde se desarrolla.

Nunca anida mas arriba de 1 metro desde la tierra; el árbol muestra especies de tapones, hechos de aserrin comprimido; en ese punto se abre un tajo con el hacha, hasta que se descubre el camino del insecto hácia arriba; en seguida se toma una pajilla i se la introduce, midiendo la distancia hasta donde está el segundo tapon; allí se vuelve a insinuar con el hacha con mucho cuidado para no herir al precioso longicornio i se saca. He traído un trozo de madera que demuestra la vida del *Cheloderus* i tambien 3 ejemplares de este lindo cerambicidío. En el *Mirtus luma* Barn. se cria un carábi-