



<http://www.biodiversitylibrary.org/>

**J.E. Voet. M Doct. Catalogus systematicus coleopterorum = Catalogue
système des coleopteres = Systematische naamlyst van dat geslacht
van insecten dat men torren noemt.**

À la Haye :Chez G. Bakhusen,[1804]-1806.

<http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/16105>

t 2: <http://www.biodiversitylibrary.org/item/54503>

Page(s): Title Page, Text, Page 11

Contributed by: Smithsonian Institution Libraries

Sponsored by: Smithsonian

Generated 24 January 2013 1:54 PM

<http://www.biodiversitylibrary.org/pdf4/015666100054503>

This page intentionally left blank.

J. E. V O E T,

M E D. D O C T.

CATALOGUS SYSTEMATICUS
COLEOPTERORUM.

TOMUS SECUNDUS.

J. E. Voet. M.Doct.

CATALOGUS SYSTEMATICUS
COLEOPTERORUM.

TOMUS II.

Catalogue Systematique
des
COLEOPTERES.
Tome 2.

Systematische Naamlyst
van dat geslacht van INSECTEN
dat men

FORRER
noemt.

II. DEEL.

à la Haye chez G. Bakhuizen.

1806.

lofitatibus insignia, quæ variolosæ, antennæ longitudine corporis, primus articulus insigniter clavatus. Unicum hujus speciei animalculum adhuc notum in splendido museo D. L. JULIAANS *Pharmacopœi Ultrajectini* expertissimi conservatur, qui hoc ex Indiis accepit.

30. CERAMBYX MELANO-LEUCOS.

Parvus in hac familia capite, thorace pedibusque nigris, elytris albis; a vertice ad elytra linea lata alba ducitur. Habitat in America.

31. CERAMBYX SUTURALIS. TAB. IX.

Hocce animal nigrum nitens, elytrorum margine interiore albo, unde tota sutura alba apparet: thorax globosus absque spinis; antennæ vix longitudine corporis. Habitat in Anglia.

32. CERAMBYX MILIARIS.

Hocce animalculum caput latius habet, quam in plurimis congeneribus, griseum ut & thorax, scutellum minimum, elytra apice rotundata, superne furva, ut & ad apicem, medio vero pallida, punctulis minimis albidis elevatis scabra: pedes nitent, antennæ longitudine corporis.

Habitat in America.

33. CERAMBYX YPSILON.

Nihil amœni in hocce animalculo. Thorax suberculatus spinosus fuscus, elytra grisea nebulosa, maculis duabus niveis y mentientibus, antennis mediocribus, primo articulo longissimo. Ex America septentrionali.

34. CERAMBYX UNDATUS.

Corpus griseum, breviusculum, fasciis duabus undalatis albis, ad quodque elytri latus macula quadrata nigra albo margine, pedes posteriores longiores. Habitat in Indiis Orientalibus.

35. CERAMBYX PICTUS.

Hujus animalculi caput latum, thorax globosus spinis duabus lateralibus; totus pulchre ruber præter maculam thoracis nigram, ut & apex elytrorum & scutellum; pedes fusci, antennæ brevissimæ. Habitat in America.

36. CERAMBYX CEPHALOSES.

Caput huic solito crassius, thorax rugosus, bispinosus, elytra apice non coeunt: totus ater, obscurus, antennæ vix longitudine corporis, incola quercuum Brabantiae & Gelriae.