

# COLEOPTERA CHILENSIA

a L. FAIRMAIRE et P. GERMAIN descripta.

---

**FERONIA (PLATYSMA) CONVEXPENNIS.** — Long. 18 mill. — Oblonga, subparallela, sat convexa, nigra, nitida, palpis piceis, capite ante valde biimpresso, antennis sat validis, prothorace paulo brevioribus, prothorace subcordato, angulis posticis rectis, basi utrinque profunde uniimpresso, stria media profunda, integra; elytris convexis, valde striatis, striis parum profunde punctatis, intervallo tertio basi bipunctato, margine externo punctis grossis impresso.

**F. (TAPINOPTERUS) SINCATIPENNIS.** — Long. 13 mill. — Elongata, subparallela, sat convexa, nigra, nitida, capite valde convexo, utrinque haud impresso, oculis grossis, antennis crassis prothorace haud longioribus, prothorace oblongo, ad basim tantum angustato, angulis posticis rectis, subacutis, basi utrinque uni-impressa; elytris oblongis, sat fortiter striatis, striis levibus, apice oblitteratis, interstitio 2° post medium bipunctato, margine externo ante apicem sat fortiter sinuato.

**TROPOPSIS UNICOLOR.** — Long. 7 mill. — Fuscus, nitidus, ore, antennis pedibusque testaceo-rufis, prothorace lateribus late marginato et reflexo, angulis posticis haud oblique truncatis, elytris striatis, striis dorso levibus, lateribus et postice oblitteratis.

**MORDELLA RUFO-AXILLARIS.** — Long. 4 mill. — Nigra, compressa, prothorace postice utrinque sinuato, albo-sericeo medio anguste marginato; elytris apicem versus parum angustatis, apice rotundatis, humeris longe rufis, ante et post medium striga albo-sericea valde angulata.

**TETRAONYX CIRCUMSEPTUS.** — Long. 5 à 10 mill. — Ater parum nitidus, antennis, antennis crassiusculis, prothorace innæquali, medio

basi foveato, grosse punctato, elytris tenuiter dense rugosulis, margine rufo, postice angustato, ad humeros dilatato.

**T. NITIDIPENNIS.** — Long. 5 à 7 mill. — Niger, nitidus, capite prothoraceque grosse punctatis, hoc antice transversim leviter impresso, basi medio foveato; elytris testaceo-luteis, obselete rugosulis, marginibus.

**ANTHICOXENUS.** — N. G. *Anthicus* affine. Palpi maxillares articulo ultimo elongato, cylindrico. Antennae apicem versus haud incrassatae, articulis oblongis, 2<sup>e</sup> tantum brevi. Caput reflexum, subquadrangulari, antice attenuatum. Prothorax globosus. Elytra lata, brevia. Tibiae apice bispinosae, tarsorum articulo 1<sup>e</sup> elongato, coxae posticae conjunctae.

**A. NIGRO-PLAGIATUS.** — Long. 6 à 9 mill. — Niger, nigro pilosus, prothorace capiteque scabrosis, hoc medio subcarinato, elytris pubescentia-cinereo-sericea dense vestitis, utrinque nigro late maculatis, maculis anticis basin haud attingentibus, transversim conjunctis; ♀ major, aptera.

**BOLITOPHAGUS COSTULATUS.** — Long. 8 mill. — Niger, sat nitidus, subparallelus, supra sat depresso, prothorace lateribus undulato et ante basin leviter sinuato, angulis anticis productis, dense granulato, elytris punctato-striatis, intersticiis granulatis et alternatim costatis, costa interiore ultra medium haud elevata.

**ADELIUM SULCATULUM.** — Long. 6 à 8 mill. — Oblongo-elongatum, aeneum, nitidum, antennis piccis, capite rugoso-punctato, antice transversim impresso, prothorace postice leviter angustato, lateribus haud explanatis, grosse punctato, inaequali, elytris profunde punctato-striatis, tarsis fulvis, sericeis.

**ANTHICUS LAGENICOLLIS.** — Long. 4 1/2 mill. — Validus, niger, capite prothoraceque densissime scabrosis, hoc antice valde attenuato, medio convexo, elytris basi paulo latioribus ante medium fascia transversa argentea, ad apicem macula auro-sericea, pedibus brevibus, tibiis rectis, validis; pa'porum maxillarium articulo ultimo ovali.

**A. MACULOSUS.** — Long. 3 1/4 mill. — Elongatus, subparallelus, niger, sat nitidus, pube cinerascente indutus, prothoracis basi sepius, elytris utrinque macula post-humerali, et ante apicem macula variabili testaceis; pedibus testaceis aut nigricantibus.

**A. SEMIRUFUS.** — Long. 3 mill. — Oblongus, parum convexus, testaceo rufus, nitidus, capite interdum elytrorumque apice nigris; capite subquadrato prothoraceque postice sensim angustato fere levibus; elytris post basim obsolete impressis, sat dense punctulatis.

**A. CRUX.** — Long. 2 mill. — Flavo-rufus, nitidus, griseo-pubescent, vitta angusta suturali ad scutellum dilatata et vitta media angusta transversali nigris, capite prothoraceque sat dense punctulatis, hoc postice angustato, lateribus fere sinuatis, elytris amplis, fortius punctatis, postice tantum attenuatis.

**A. HOLOXANTHUS.** — Long. 1 2/3 mill. — Flavus, subdepressus, capite subquadrato, antennis apice crassioribus, prothorace multo brevioribus, hoc postice sensim attenuato, sed lateribus rectis, elytris subparallelis, apice tantum attenuatis, fortius sat dense punctatis.

**A. NIGRO-FEMORATUS.** — Long. 3 mill. — Niger, nitidus, prothorace, tibiis tarsisque rufis, elytris utrinque post humeros macula parva rotundata lateralii signatis, capite convexo, brunneo-rufescente, prothorace postice attenuato, basi marginato, elytris parum convexis, tenuissime punctulatis, griseo sat dense pubescentibus.

**A. PLANICOLLIS.** — Long. 2 2/3 mill. — Elongatus, depresso-ruso-testaceus, capite infuscato, elytris parallelis, fuscis, griseo-pubescentibus, maculis flavis 2 utrinque ornatis, anticis transversum conjunctis, prothorace antice capite paulo latiore, postice valde angustato.

**LAGRIOMA.** — N. G. *Lagriis* affine. Oculi integri, ovati. Labrum transversum integrum. Palpi maxillares articulo ultimo sericeiformi. Caput collo lato, brevissimo allatum. Antennae prothorace paulo longiores, articulo 2<sup>o</sup> 3<sup>o</sup> breviore, articulis 3 ultimis aequalibus precedentibus brevioribus, paulo crassioribus. Prothorax subcylindri-

cus. Scutellum subrotundatum. Elytra convexa, prothorace basi latiora, punctata. Pedes mediocres, tibias apice mucrone brevi armatis, tarsorum articulo 1° elongato, penultimo profunde bisido.

*L. RUFULA.* — Long. 5 à 7 mill. — Oblonga, rufescens, griseo-pubescentia, dense punctata, prothorace utrinque obsolete sinuato, angulis posticis ♂ rectis, ♀ obtusis, subtus leviter infuscata.

*L. OBSCURELLA.* — Long. 4 à 5 mill. — Fusca, griseo-pubescentia, dense punctata, antennis, palpis pedibusque rufescens; precedenti simillima, sed minor, angustior, magis convexa, elytris antice magis angustatis, humeris subrotundatis, prothorace postice magis angustato.

*MELUS ANTHRACINUS.* — Long. 10 à 23 mill. — Ommium niger, sat nitidus, capite sparsim punctato, medio sulcato, prothorace lateribus angulato, antice profunde transversim sulcato, postice valde soveato, medio sulcato, elytris valde clathratis; unguibus fisis.

*M. PICIPES.* — Long. 14 mill. — Niger, sat nitidus, antennis, palpis pedibusque rufo-piccis, prothorace lateribus angulata, antice profunde transversim sulcato, medio sulco longitudinali et utrinque sovea obliqua; elytris lateribus compressis, clathratis; unguibus haud fisis, intus medio emarginatis.

*OTIDERES DENTICULATUS.* — Long. 18 mill. — Nigro-fuscus, squamis cinereis et brunneis variegatus, nigro-granulatus, rostro medio carinulato, prothorace lateribus medio dilatato-truncato, elytris ovato-oblongis, valde striatis, interstiliis elevatis, alternatim convexitibus, apice utrinque bidentatis, ante apicem macula albosericea.

*HELIOPUS LOESICOLLIS.* — Long. 16 mill. — Oblongus, subparallelus, ater, indumento lutose tectus, prothorace antice attenuato, sparsim granulato, utrinque valde impresso, medio subcarinato, elytris subplanatis, compressis, apice truncatis, mamillatis, humeris valde prominentibus apice valde quadrituberculatis et ante apicem transversim sulcatis.

*H. TUBEROSUS.* — Long. 16 mill. — Aterrimus, sat nitidus sub-

parallelus, prothorace lateribus medio dilatato, tuberculato, antice profunde tri-impresso, medio sulcato, elytris postice oblique truncatis, granulatis et utrinque tuberculatis grossis biseriatim dispositis, lateribus lineatum granulatis.

**BENTES INTEGRICOLLIS.** — Long. 6 mill. — Fuscus, testaceo variegatus, antennis corpore haud longioribus, prothorace lateribus rotundato, vix conspicue crenulato, tenuissime punctulato, elytris striato-punctatis, lateribus haud carinatis, pedibus obscure testaceis.

**CALLIDIOPHIPUS CLATHRATUS.** — Long. 7 mill. — Niger, pilis cinereo-rufulis longis parum dense hirtus, capite opaco, rugoso; prothorace antice posticeque angustato, lateribus gibboso, atro, opaco, dense ac profunde punctato; scutello cinereo-pubescente; elytris glabris, subnitidis, dense clathratis; antennis fulvis, pedibus nigris, femoribus vix clavatis.

**CARDIOPHORUS HUMERALIS.** — Long. 4 mill. — Nigro-piceus, obscure pubescens, tenuissime punctulatus, prothorace convexo, elytris profunde striato punctatis, macula humerali flavo-testacea; variat: capite, prothorace, antennis pedibusque plus minusve rufulis.

**PYROPHORUS CONICICOLLIS.** — Long. 15 à 22 mill. — *P. variolosus* simillimus, sed prothorace antice sensim attenuato angulis posticis divaricatis, apice oblique truncatis, medio magis carinato et elytris postice angustioribus sat distinctus.

**CRYPTOHYPNUS NIVALIS.** — Long. 3 mill. — Piceus, nitidus, punctulatus, rufo-pubescent, capite medio leviter impresso, prothorace interdum rufo-brunneo, postice angustato, angulis posticis acutis, vix productis, elytris haud striatis, utrinque plaga magna humerali, trianguli, et macula subapicali, ovata, interdum obsoleta, flavo-testaceis; antennarum basi pedibusque rufo-testaceis.

**C. ANDICOLA.** — Long. 7 à 8 mill. — Elongatus depresso, brunneus, nitidus, subtus cum ore antennis pedibusque rufo-testaceus, capite dense punctato, prothorace elongato, postice constricto, tenuiter punctato, medio leviter canaliculato, scutello rotundo, seri-

ceo, elytris punctato-striatis, apice subacuminatis, vase rufo-margi-natis.

**CAMPYLOXENUS.** — N. G. *Campylis* affine. Palpi maxillares articulo ultimo securiformi. Caput haud carinatum, prosterno os obte-gente, labro integro. Antennae sat elongatae, compressæ, ♂, serratae, ♀ simplices, articulo 2° minuto. Oculi sat magni, rotundati. Mandibulae breves. Prothorax translucens, maculis 2 sternalibus pho-phoreis, angulis posticis valde productis. Prosternum postice breve, compressum, arcuatum, metathorace antice anguste producto.

**C. PYROTHORAX.** — Long. 13 mill. — Elongatus, parum convexus, niger, parum nitidus, cinereo pubescens, capite densissime punctato, prothorace elytris angustiore, medio sulcato, rufo, utrinque trans-lucido-pallido, angulis posticis nigricantibus, elytris tenuiter striato-punctatis, intersticiis tenuiter ac densissime punctulatis.

**HOMALOCERUS ARGUS.** — Long. 14 mill. — Elongatus, lateribus compressus, fusco-brunneus, nitidus, sulcis capitis 2, prothoraci 3 et baseos utrinque elytri 4, pube flavicante plenis, elytris postice valde attenuatis, apice acutis, productis, parum dense punctatis, medio macula rotunda griseo-pubescente oculata, lateribus longitudinaliter valde impressis; corpore subtus nigricante, utrinque vitta albido-pubescente; pedibus brunneo-rufis.

**H. ALBIDOVARIUS.** — Long. 15 mill. — Elongatus, navicularis, convexus, niger aut fuscus, pube albida variegatus, capite bivittato, prothorace trilineato, elytris sparsim granulatis, apice obtuse acutis, albido sparsutis, macula media subrotundata albida, apice albido subvittatis, subtus dense rufescenti-griseus.

**H. BALTEATUS.** — Long. 16 mill. — Oblongus, crassus, leviter planatus, ater, albido atomarius, prothorace postice parallelo, ante angustato, granulato, scutello nigro-velutino, elytris apice obtusis, albido vermiculatis, punctis nigro-velutinis sparsutis, vitta media transversa flavido-albida, sutura interrupta, lateribus subcostatis; subtus cum pedibus ater, albido-varius.

**MHYNCITES VIOLACEIPENNIS.** — Long. 4 mill. — Elongatus,

capite, rostro prothoraceque viridi-aneis, dense punctatis, elytris oblongis, foveolato-lineatis, dorso transversum leviter rugosulis, violaceis, sutura virescente, antennis fuscis, pedibus rufescentibus.

**A. ADIORTUS ALBOSTRIGOSUS.** — Long. 10 mill. — Oblongus, convexus, fuscus, brunneo dense squamoso-pubescentis, rostro carinato, prothorace lateribus subangulatum rotundato, dense punctulato, carinula media obsoleta; elytris oblongo-ovatis, late punctato-striatis, interstitiis convexis, utrinque vitta lateralī angusta et sutura postice albido-griseis.

**A. PERFORATUS.** — Long. 14 mill. — Oblongus, compressus, crassus, niger, nitidus, antenam tarsisque fusco-piceis; capite dense punctato, rostro rugoso punctato, medio leviter carinato, prothorace lateribus subangulatum dilatato, dense ac grosse punctato, linea media levi; elytris lineato-foveatis, interstitiis convexis.

**A. CRASSIROSTRIS.** — Long. 13 mill. — Oblongus, minus compressus, niger, nitidus, griseo parce pubescens; capite sat dense punctato, inter oculos foveola minuta; prothorace lateribus obtuse rotundato, fortiter punctato, lateribus dense, dorso sparsim, spatio medio fere levi, antice posticeque transversim leviter impresso; elytris valde lineato-foveatis, interstitiis subplanis, tenuiter punctulatis et alutaceis.

**A. PRALONGUS.** — Long. 9 à 11 mill. — Elongatus, niger, nitidus, fulvo-cinereo parce pubescens; rostro rugoso, medio carinato, capite dense ac tenuiter punctato; prothorace lateribus vix arcuato, tenuiter ac dense ruguloso-punctulato; elytris punctis grossis striatis, interstitiis subconvexis, tenuiter rugosulis, fulvo-cinereo squamosulis.

**A. GONODERUS.** — Long. 17 à 20 mill. — Oblongo-elongatus, subparallelus, convexus, nigro-fuscus, subopacus, maculis griseo-pubescentibus tessellatus; capite dense punctato, prothorace transverso, lateribus medio dilatatis, postice angulatis, ante basim emarginatis, grosse punctato, lateribus densius; elytris foveolato-striatis, interstitiis convexis, tenuiter rugosulis; ♀ crassa, elytris oblongo-ovalis, interstitiis minus convexis.

*LISTRODERES? PERCOSTATUS.* — Long. 16 mill. — Oblongus, supra fere planatus, omnino niger, nitidus, glaber, rostro rugoso, carinato, capite tenuiter punctato; prothorace lateribus antice angulato, supra utrinque biimpresso, grosse punctato, medio minus; elytris utrinque tricostatis, sutura costata, interstitiis latis transversim riguis, medio obsolete elevatis; ♀ magis convexa, prothorace medio levavi, elytris apice dente conico armatis.

*STIGMODERA CYANICOLLIS.* — Long. 22 mill. — Cyaneo-metallica, elytris ochraceis nitidis, post medium fasciis 2, anteriore interrupta et macula apicali cyaneo-metallicis; prothorace fere conico, parum dense punctato, lateribus obsolete impresso; elytris post me-  
dium lateribus serratis.

*CHRYSONOTHRIS NOTHRIDERES.* — Long. 13 mill. — Oblongus, teneus, cupreo obscure marginatus, albido parce pruinosis; prothorace lato, valde rugoso, utrinque impresso, fovea media lata, elytris rugosis, tricostatis, costis lateralibus clathratis, utrinque leviter bi-impressis.

Paris, 15 juin 1800.