

# COLEOPTERA CHILENSIA

« L. FAHRENBACH et P. GERMAIN descriptis.

## II.

**FERONIA OROBIA.** — Long. 13 mill. — *F. erraticæ* affinis, sed magis elongata, minus convexa, prothorace magis cordato, antice latiore, supra deplanato, elytris ad humeros minus angulatis, longioribus, dorso leviter depressis.

**LIOSCHEMA N. G.** — *Cryptarchis* et *Ipidibus* affine, ab illis fronte graduatim angustata, antennarum articulum primum haud obtegente, apice prosterni emarginato, ab his elytris amplioribus, apice prosterni metasternum tangente, mento late emarginato.

**L. NIGRICOLLE.** — Long. 8 à mill. — Nigrum, nitidum, subtiliter punctulatum, capite trifoveolato, prothorace antice valde angustato, lateribus arcuatis, marginatis, elytris postice parum angustatis, fulvo-castaneis, nigro-marginatis.

**L. RUBROVARIUM.** — Long. 9 à 10 mill. — Oblongum, postice leviter attenuatum, parum convexum, nitidum, nigrum, prothorace lateribus flavo anguste marginato, hoc margine canaliculato, elytris aut nigris rufo pictis, aut rufis lateribus nigro maculatis; capite tenuiter punctato, prothorace elytrisque vix perspicue tenuiter punctulatis.

**CRYPTARCHA SUBCAUDATA.** — Long. 4 1/2 mill. — Fere elliptica, parum convexa, nigro-fusca, nitida, ore et marginibus rufescentibus, capite prothoraceque dense tenuiter punctulatis, hoc utrinque impresso, elytris apice productis, apice ipso angulato, tenuissime punctulatis, utrinque 3 aut 4 lineis elevatis tenuissimis, laxè punctis elevatis.

tis munitis, utrinque maculis flavescentibus cum margine confluentibus; subtus nigra, antennis pedibusque rufescentibus.

**DORCUS PALLIDO-CINCTUS.**—Long. 15 à 18 mill.—*D. vittato* facie simillimus, sed prothorace angulis posticis oblique truncato, pallido marginato, elytris que grosse punctatis, vitta marginali pallida sericea.

**BOLBOCERAS NASUTUS.** — Long. 18 mill. — Castaneus vix nitidus, subtus cum femoribus pallide fulvus, fulvo-pubescent, tibiis tarsisque obscurioribus; ♂ capite supra planato, antice cornu brevi, erecto, postice bicarinato, armato; prothorace medio bi-excavato, excavatione infera fere triangulari; elytris tenuiter striato-punctatis, striâ suturali profundiore.

**B. BINASUTUS.** — Long. 22 mill. — Castaneus, parum nitidus subtus pallide fulvus, fulvo-pubescent; ♂ capite supra planato, antice compresso-elevato, bidentato, dente antico prominente, prothorace antice late excavato, margine superiore acuto, utrinque obtuse angulato, excavatione nitida; elytris tenuiter punctato-striatis, stria suturali paulo profundiore; ♀ capite antice dente transversim compresso, inter oculos dente truncato et utrinque carina brevi transversa.

**B. DISTINGUENDUS.** — Long. 22 mill. — Præcedenti s'millimus, sed ♂ capitis dente antico brevior et magis erecto, dente postico apice bituberculato; ♀ capitis dente antico haud compresso et postice dentibus duobus brevibus, distinctus.

**LUCIDOTA BIFENESTRATA.** — Long. 14 mill. — Oblonga, nigra, cinereo parce pubescens, prothorace maculis duabus subquadratis, basi arcuatis, rubris, margine antico anguste pallido, antennis minus validis, elytris oblongis, tenuissime dense granulatis, utrinque evidenter bicostatis, costis obliquis.

**L. HÆMORRHOÏA.** — Long. 10 mill. — *L. lugubri* similis sed major, antennis brevioribus, basi latioribus, prothorace latiore, angulis posticis minus acutis, obtuse rectis, vitta media nigricante antice lata, maculis rubris flavido extus marginatis, elytris minus

elongatis, basi latioribus, distinctius bicostulatis, et abdominis segmento ultimo sanguineo.

*LUCIDOTA ? SPULIPENNIS.* — Long. 5 mill. — Fusca, antennis ab articulo 3<sup>o</sup> flabellatis, prothorace parvo, subquadrato, margine elevato, rugoso-punctato, inaequali, rubro, margine antico nigro, elytris abdomine vix brevioribus, debiscentibus, apice attenuatis, rugosulis, alis infuscatis, abdomine rubro.

*SILIS CRASSICORNIS.* — Long. 4 1/2 mill. — Sat brevis, nigra, prothoracis lateribus late rufescentibus; antennis validis, corpore dimidio parum longioribus, articulo 2<sup>o</sup> brevissimo, segmentibus obconicis, 3 aut 4 ultimis oblongis, attenuatis; prothorace lateribus medio sinuato, carinula media tenui, utrinque ante basin tuberculatis 2 rotundatis, laevibus, subdepressis; elytris cinereo pubescentibus.

*THANASIMUS VITTULA.* — Long. 7 mill. — Parallelus, nigro-ceneus, nitidus, antennis, ore, tibiis tarsisque pallide flavidis, prothorace medio elytris haud angustiore, inaequali, grosse et parce punctato, elytris rugulosis, suturam versus substriatis, vitta longitudinali flavida aut rubra, apice oblique truncatis.

*T. SEMIRUFUS.* — Long. 6 mill. — Rufus, nitidus, fere laevis, parum convexus, capite tenuiter dense punctato, prothorace subcordato, utrinque nigro plagiato, vitta basali transversa nigra, elytris albido-hispidis, dimidia parte fusca ab anteriore vitta oblique albida separata, apice ipso albido marginato.

*T. PARALLELUS.* — Long. 6 mill. — Sat convexus, nitidus, fuscus, capite prothoraceque testaceo-flavis, antennis, palpis pedibusque dilutioribus, elytris hirsutis, vitta lata pallide flavida, submarginali, apice cum altera arcuata; capite impresso, impressione medio elevata, prothorace brevi, postice angustato, fere laevi, elytris rugulosis, suturam versus substriatis.

*CLERUS SEMI-METALLICUS.* — Long. 7 mill. — Niger, villosus, nitidus, elytris basi sanguineis, post medium chalybeo cyaneis, capite grosse punctato, spatio medio laevi, prothorace postice angustato,

grosse ac dense punctato, utrinque oblique impresso, antice polito, elytris basi alternatim costulatis et transversim elevato-politis, post medium politis.

*COINTHUSCUS*. N. G. — *Tillis* peraffine, antennarum autem clava triarticulata, reliquos articulos conjunctos longitudine superante, sat distinctum.

*C. INSIGNICORNIS*. — Long. 5 mill. — Atrio-cyanus, nitidus, elytris striga media transversali arcuata albida; capite prothoraceque dense ac fortiter punctato-strigosis, hoc basi constricto, ante basin utrinque angulato, elytris apice leviter dilatatis, basi fortiter punctato-lineatis, villosis, utrinque bigibbosis, medio depressis, post medium convexis.

*XYLOPENTHA SULCICOLLIS*. — Long. 4 1/2 mill. — Elongata, cylindrica, fusco-brunnea, dense punctata, elytris paulo fortius, prothorace medio canaliculato, antice prominente, sat acute tuberculato, elytris pubescentibus apice truncatis, in truncatura sutura valde elevata.

*EXORIODES SPINICOLLIS*. — Long. 8 mill. — Elongatus, fulvus, fulvo-pilosus, parum nitidus, capite nigricante, punctato, prothorace globoso, punctulato, dorso gibboso, antice oblique truncato, sex-denticulato, elytris, opacis, crebre punctatis, subrugosis, apice declivibus, haud truncatis, inermibus, tarsis elongatis.

*PHYSOGASTER GLOBULUS*. — Long. 5 mill. — Brevis, elytris globosis, obscure brunneus, cinereo-pubescentis, lateribus longe griseo-pilosus, prothorace brevissimo, lateribus angulisque posticis rotundato, angulis anticis rectis, parce evidenter asperato, elytris tenuiter parcius asperatis; subtus obscurior.

*P. OBLONGULUS*. — Long. 4 1/2 mill. — Oblongus, minus convexus, fusco-brunneus, sat nitidus, parce ac breviter cinereo-hirtus, prothorace lato, lateribus cum angulis posticis rotundato, angulis anticis acutis, dense ac tenuissime ruguloso-punctato, elytris ovalis, prothorace parum latioribus, evidenter asperatis, lateribus ciliatis.



**EUSCHIATA PUNCTATO-STRIATA.** — Long. 12 à 15 mill. — Ovato-oblonga, aterrima, nitida, convexa, prothorace tenuiter sat dense punctato, lateribus ante basin obliquis, elytris striatis, striis parum impressis, sat grosse parum dense punctatis, interstitiis vix convexis; ♀ oblongior, elytris vix striatis, striarum punctis minoribus, interstitiis planatis.

**AMOMPHALPUS.** N. G. — *Serropalpis* affine, sed corpore magis lineari, antennis longioribus, articulo 2° tertium æquante, apicem versus suberassioribus, capite subtus inflexo, magis prominente, palparum maxillarium articulo 2° simplici, 3° obconico, 4° cultriformi, haud productis, et labro brevioribus distinctum.

**A. QUADRIPLAGIATUS.** — Long. 7 mill. — Linearis, ater, cinereo-sericans, elytris utrinque eburneo late plagiatis, prothorace oblongo, antice attenuato, basi medio breviter striato, elytris apice obtuse acuminatis, abdomine dimidia parte basali flavida.

**ADELUM ÆNEUM.** — Long. 5 à 6 mill. — Elongatum, prothoracis angulis posticis subrectis, elytris striato-punctatis, interstitiis planatis, punctis densis seriatim impressis. *A. sulcatulo* simillimum stature minorè, angustiore, prothorace antice posticeque æqualiter angustato et striis latis, parum profundis, distinctum.

**EUCALIGA.** N. G. — *Pyrochrois* facie affine, sed ad *Cistelidas* referendum. Corpus parum convexum, postice leviter dilatatum. Caput obliquum, antice productum, antennae valida, obtuse serrate, dimidio corpore haud longioribus, articulo 2° brevi. Palpi maxillares articulo ultimo securiformi, labro transverso, arcuato. Coxae anticae globosae, haud contiguae, 4 tarsorum anticorum articulis 2 penultimis lamellatis.

**C. SANGUINICOLLIS.** — Long. 9 à 11 mill. — Nigra, opaca, subtus nitidior, prothorace et elytrorum macula humerali sanguineis, prothorace transverso, lateribus rotundato, striga media nigra, elytris prothorace latioribus, post medium leviter ampliatis, tenuiter punctato-substriatis.

*ZONITIS NIGROTARSATUS*. — Long. 10 mill. — Omnino stramineo-flavus, antennis, articulo 1° excepto, apice palporum et mandibularum, genibus, tarsis, pectore medio abdominisque basi nigris; capite punctato, medio fere gibboso, prothorace transversim quadrato, parce punctato, scutello concavo, elytris tenuissime asperatis.

*CYCLODERUS SIGNATICOLLIS*. — Long. 10 mill. — Niger, parce cinereo pubescens, capite antice prothoraceque pallide testaceis, hoc basi utrinque fusco oblique signato, utrinque valde impresso, medio leviter sulcato, lateribus crenulatis, basi breviter rectis, elytris grosse punctatis, utrinque unicostatis.

*NACERDES JANTHINA*. — Long. 9 1/2 mill. — Violaceo-cyanea, parum nitida, subtus cyanea, nitidissima, prothorace rufo, antennis palpisque nigris, femoribus cyaneis, tibiis violaceis, tarsis fuscis; capite prothoraceque parce punctatis, elytris tenuissime ac dense punctato-rugulosis.

*DIPTYLUS CINERASCENS*. — Long. 10 mill. — Parum elongatus, convexus, fuscus pube cinerea dense tectus, antennis, ore, pedibus prothoraceque obscure fulvescentibus, capite nigricante, femoribus infuscatis; antennis gracilibus, prothorace postice angustato, ante medium infuscato, elytris apice obtusis.

*NIMALES*. N. G. — *Selenopalpis* affine, sed corpore angustiore, subaptero, elytris abdomine paulo brevioribus, palporum maxillarium articulo ultimo fere securiformi, extus arcuato, labro fere quadrato et prothorace valde elongato distinctum.

*N. LONGICORNIS*. — Long. 7 mill. — Fuscus, cinereo pubescens, capite prothoraceque nitidis, hoc basi angustato, utrinque leviter impresso, elytris sat convexis, medio macula oblonga parva communi et utrinque macula parva marginali fulvis; antennis corpore paulo longioribus, basi fuscis, apice rufescentibus.

*MEGOPSALAPHUS RUBRICOLLIS*. — Long. 8 mill. — *M. maculicotti* simillimus, sed minor, angustior, prothorace immaculato, elyptico pallido et elytris apicem versus attenuatis distinctus.

**SALPINGUS VARIEGATUS.** — Long. 2 1/2 mill. — Dilute luteo-  
aenescens, capite prothoraceque obscurioribus, antennis basi, ore,  
pedibus elytrisque pallide luteis, vage fusco-maculosis; dense tenuiter  
punctatus, prothorace medio leviter sulcatus, elytris gresse punctatis,  
post scutellum leviter impressis.

**S. ANTHRACINUS.** — Long. 3 1/2 mill. — Niger, submetallicus,  
nitidus, pedibus antennisque obscure piceis, his basi testaceis, capite  
punctato, antice levi, prothorace punctato, basi constricto et utrinque  
fortiter transversim impresso, elytris valde punctato-lineatis, et se-  
riatim griseo pilosis.

**HOMALOCERUS EXQUISITUS.** — Long. 7 mill. — Oblongo-elonga-  
tus, vio'aceo-cupreus, capite vittis duabus, prothorace vittis tribus  
impressis flavo-tomentosis, rostro nigro, antennis nigricantibus, arti-  
culorum primorum basi flava, elytris foveis magnis flavo-tomentosis,  
triseriatim dispositis, apice uni-spinosis; subtus lateribus griseo-to-  
mentosus, pedibus rufo-testaceis, tarsis nigricantibus.

**NAUPACTUS SUBVITTATUS.** — Long. 7 à 10 mill. — Ovatus, con-  
vexus, fuscus, griseo aut flavo farinosus, prothorace vittis 2 vagis,  
elytris vitta dorsali, saepe interrupta, albidis, prothorace convexo,  
medio tenuiter sulcato, elytris ovoideis, convexis, basi prothorace  
haud latioribus, substriato-punctatis, interstitiis leviter convexis, pi-  
losulis; subtus cum pedibus griseo-farinosus, antennis fuscis, gri-  
eo-squamosis.

**ADIORISTUS AXILLARIS.** — Long. 13 mill. — Ater, parum nitidus,  
pube brevi cinerascete parce indutus, capite rostroque punctato-  
rugosis, prothorace convexo, antice posticeque fere aequaliter angus-  
tato, dense punctato-rugoso; elytris oblongis, sat late sulcatis, sulcis  
sat dense tomentosus interstitiis convexis, postice rugatis; ante apicem  
utrinque tuberculo obtuso, apice ipso obtuso, divaricato. — Variat  
immaturus plus minusve rufescens aut plus minusve griseo-pu-  
bescens.

**MEGALOMETIS XANTHOMELAS.** — Long. 8 à 10 mill. — Oblongus,  
antice attenuatus, pallide flavo-virescens, nigro-varius, *M. aurco-*

*signato*, simillimus, sed ♂ prothorace medio longitudinaliter impresso et medio leviter carinato, elytris minus foveatis et tuberculis intermediis minus posticis distinctus, ♀ via differt.

*CALLIDERIPHUS CLATHRATUS*. — Long. 7 1/2 mill. — Niger, pilis longis, cinereo-rufulis parè hirtus, capite opaco rugoso, prothorace antice posticeque angustato, lateribus gibboso, atro, opaco, dense et profunde punctato, scutello cinereo-pubescente, elytris glabris, subnitidis dense clathratis, antennis fulvis articulis versus apicem longitudine decrescentibus, pedibus nigris, femoribus vix clavatis.

Paris, 1<sup>er</sup> juin 1861.