

## ALGUNOS ARTROPODOS DE RIO BLANCO

POR EL

Prof. Dr. Carlos E. PORTER

Nuestro buen amigo y colega el señor Rafael Barros ha tenido la bondad de cedernos algunos artrópodos cogidos por él en Dicbre. del año ppdo. y en Marzo del pte. año en Río Blanco.

No estará demás la publicación de la lista de las especies como una contribución a la geografía zoológica del país.

Estas especies son:

### Arácnidos

*Scytodes globula* NIC.—Gay dice que habita Santiago. Hemos visto esta especie en varias partes de Chile.

*Dysdera crocata* NIC.—Nos ocupamos de esta especie en esta misma Revista, año XXI (1917), p. 178.

*Segestria pusilla* NIC.—La especie no parece común. Se encuentra también en las provincias de Valparaíso y Santiago.

*Mastophora gasteracanthoides* (NIC.) BRÈTHES. Es la "araña podadora" o "cabeza de gato". Habita desde Acoigagua hasta Valdivia. No es común.

Un estudio sobre esta araña fué publicada por nosotros en esta misma Revista, año XXII (1918), páginas 139-143 acompañado de dos figuras.

El señor Barros la ha tomado ahora a 1600 metros sobre el nivel del mar.

*Misunemops pallens* (KEYSERLING) SIMON.—Recordaremos que, además de en Chile, la especie habita, según PETRUNKEVITCH, en Guatemala, Colombia, Perú y Brasil.

*Thomisus depressus* NIC.—Gay encontró este arácnido en Illapel y Santiago.

*Athus argentatus* NIC.

### Rincotos

*Jalloides sanguineosignatus* (SPIN.)

*Apateticus nigrolimbatus* (SPIN.)

*Acedra albocostata* (SPIN.) KIRK.

*Eldarca haematomera* (SPIN.) SIGN.

*Leptoglossus chilensis* (SPIN.) STAL.

*Aradus angustellus* (BL.) SIGN.

*Melizoderes carinatus* BL.—Nosotros lo hemos tomado muchas veces en Valparaíso.

Debiendo publicarse por nosotros mismos, en breve, sinopsis de las familias de Rincotos y de los géneros de Cerambycidae a que pertenecen las especies que aquí anotamos, economizaremos dar, por ahora, más pormenores sobre ellas.

### Coleópteros

*Hesperophanes inspergatus*

*Phymatoderus bizonatus* BL.

*Phymatoderus bizonatus* BL.

*Calydon submetallicum* BL.

*Callideriphus laetus* BL.

*Callideriphus transversalis*

F. & G.

*Brachychilus lituratus* BL.

*Drasalia praelonga* F. & G.

*Emphytoecia suturella* BL.

También mencionaremos aquí el conocido *pilme* del que vienen ejemplares.

### Ortópteros

Por último dejamos aquí constancia de un ejemplar joven de un *Mántido*, encontrado en el estómago de un *pequén* (*Speotyto cunicularia*) a 1750 m. de altura, por el Sr Barros en el mes de Marzo.



Fig. 12.—*Hesperophanes inspergatus* F. & G., aumentado (Orig.)

SANTIAGO DE CHILE, MAYO DE 1926.