

INSECTOS DE VARIAS PROCEDENCIAS (*)

POR EL

PROF. DR. CARLOS E. PORTER

No necesito repetir lo tantas veces expresado por mí mismo y otros autores que la obra de don Claudio Gay o no indica localidad o da la de aquella en que el sabio explorador de nuestra tierra colectó por sí mismo o le obsequiaron la especie. El *Catálogo* de los Coleópteros de Chile del Prof. Fed. Philippi, publicado en 1887, anota para un buen número de dichos insectos el área; para otros no da ninguna o repite la de Gay. Tampoco necesitaría recordar que numerosas listas publicadas después por varios especialistas han hecho progresar mucho el conocimiento en materia de distribución geográfica de nuestras especies. Y el que ésto escribe ha prestado especial atención al asunto desde la fundación de la *Revista Chilena de Historia Natural*.

Voy a aprovechar la presente sesión para anotar las localidades para varios insectos de este país, unos cogidos por mí mismo y otros por amigos y colegas en diversas provincias.

COLEÓPTEROS

Por ahora he determinado los siguientes:

Adalia deficiens Muls. -Vallenar XI-1933. Aug. Bravo

Spermophagus Thomasi Bréthes. Vallenar, 1933. A. Bravo.

Epicanta pilmus (Mol.) Porter. Vallenar, A. Bravo, XI, 1933.

Astylus trifasciatus. Tomé dos ejemplares en Papudo (II, 1914) de este insecto que es, como dice don Fed. Philippi, la *Mecoglossa rugosa* Sol. en Gay; pero está figurada en la lám. 9 y no en la 10.

Rhytidophorus rufipennis Sol. (En género *Emenadia* en el «Cat. de Col. Chile», de don Fed. Philippi, donde se dice: Coquimbo y Santiago). Un ejemplar ♂ de Vallenar XI, 1933 (A. Bravo). Más recientemente el Dr. E. Ureta R. me ha cedido una ♀ tomada por su hermano en Copiapó, II, 1934. Agregaré a la descripción de Gay (V, p. 275) que en las uñas son anaranjadas.

Phaleria Gayi Cast. He cogido yo mismo en las playas

(*) Nota leída en sesión general del 9 de Mayo de 1934 de la *Sociedad Chilena de Historia Natural*.

de Constitución (II, 1934), 9 ejemplares que presentan diversas variaciones en su colorido.

La variabilidad de esta especie, que se encuentra bajo algas en las playas, había sido ya indicada por Gay, V, p. 245.

Chenoderus octomaculatus F. y G. —Aysen II, 1934.

Calydon submetallicum Bl. —Aysen, II, 1934.

Mallosoma globithorax (F. & G.). —Aysen, II, 1934. —Creo que es la localidad más austral en que se encuentra este insecto. Fué descrito primitivamente de Chillán (1860), lo que repite don Fed. Philippi (1887).

He obtenido los tres Cerambícidos anteriores de los SS. Dr. E. Ureta y R. P. Pirion.

Callideriphus laetus Bl. —Especie común en la República. Un ejemplar de Vallenar (A. Bravo, 15-XI-1933) es hoy el más pequeño de mi colección. El protorax (negro) presentan una manchita roja pequeña en el dorso y dos algo mayores a los lados.

Syllitus pseudocupes F. & G. —Un alumno que ha colectado insectos en Pemehue me trajo 1 ♂ y 1 ♀, II, 1934.

Por último entre los coleópteros haré mención de un *Meloide* recibido del Dr. R. Garjardo (Paihuano, Elqui, II, 1934), que no tenía aun en mi colección de esta familia de insectos.

BRACÓNIDOS

Debo dejar constancia de que en mi excursión a Papudo, en Febrero del presente año, he encontrado entre otros Braconídeos por estudiar la especie *Rhogas erithroderus* (Spin.), que figura en el Gen. *Aleiodes*, y como habitando el norte de la Rep., en la obra de Gay.

He recibido además del Prof. Luis Sierra, de Copiapó, un microhimenóptero de la misma familia, nuevo para la ciencia y que he denominado *Opius atacamensis*. Luego daré una descripción y figuras de este insecto.

RINCOTOS

Entre algunos insectos de este orden que me obsequiara el Dr. E. Ureta R. de los colectados en Copiapó por su hermano en Marzo del presente año, figuran las dos siguientes especies que en Gay, etc. aparecen habitando mucho más al sur. Estas especies son: *Oncopeltus miles* (Bl.) y *Lygaeus alboornatus* Bl.

Instituto de Zoología General y Sistemática,

SANTIAGO, 6 de Mayo de 1934.