



<http://www.biodiversitylibrary.org/>

**Voyage autour du monde : exécuté par ordre du roi, sur la corvette de Sa
Majesté, la Coquille, pendant les années 1822, 1823, 1824, et 1825 : sous le
Ministère et conformément aux instructions de S.E.M. le Marquis de
Clermont**

Paris :Arthus Bertrand,1825-1830 [i.e. 1838]
<http://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/57936>

v 5.t 2..ptie.2: <http://www.biodiversitylibrary.org/item/119038>
Page(s): Title Page, Page 128, Page 129

Contributed by: Smithsonian Institution Libraries
Sponsored by: Biodiversity Heritage Library

Generated 7 June 2012 9:20 AM
<http://www.biodiversitylibrary.org/pdf3/011078200119038>

This page intentionally left blank.

recevoir le premier article des antennes, dirigé en dessous, l'autre partant des yeux et venant finir insensiblement vers l'insertion des antennes. Lèvre inférieure linéaire, mandibules saillantes, bidentées. Yeux de grandeur moyenne, peu saillants, placés à la base du rostre, et dirigés en avant. Corselet très-étroit en avant, très-élargi en arrière, arrondi sur les côtés, ayant en dessous un faible sillon impropre à recevoir entièrement le rostre dans le repos. Élytres coniques en arrière, assez bombées. Pattes très-grandes, avec les cuisses un peu renflées et armées d'une petite dent en dessous. Tarses courts, larges, aplatis, avec l'avant-dernier article en cœur et profondément bilobé.

Ce nouveau genre doit être placé entre les *Cleogonus* et les *Ocladius*; il se compose de deux espèces dont l'une est publiée dans le voyage de *l'Astrolabe* sous le nom d'*Archarias* à pieds longs, pl. VII, fig. 22.

ARACHNOPE A BANDE, *Arachnopus striga*. GUÉR. — *Ater, antice posticeque attenuato, fascia interrupta albâ ad basin elytrorum. Pedibus utrinque albo-ciliatis.* — L. 15 mill., l. 6 m.

Chryptorhyncus striga. Latr. Atlas, Ins. pl. VI, fig. 5.

Il est d'un noir peu luisant; sa forme est tout-à-fait rhomboïde, c'est-à-dire qu'il est étroit en avant et en arrière, et large au milieu. Sa trompe, avec la tête, forme presque le tiers de sa longueur; elle est courbée régulièrement depuis sa base, lisse, avec quelques granulations près des yeux. Le corselet forme un peu moins de l'autre tiers; il est un peu plus long que large, conique, tronqué aux deux extrémités; il est uniformément rugueux, terne, ou peu luisant. Les élytres sont de la largeur du corselet à leur naissance; elles s'élargissent un peu aux épaules, et se terminent de suite en un cône presque semblable à celui que forment le corselet et la tête sans le rostre; elles sont soudées, rugueuses, et leur base est marquée d'une bande blanche transverse, assez étroite, formée par des écailles très-courtes et serrées. Le dessous du corps est plat, lisse. Les pattes sont grandes, insérées à une distance notable les unes des autres, les postérieures étant attachées tout-à-fait sur les côtés du corps, sous le bord des élytres. Les cuisses sont grandes, rugueuses, un peu renflées vers l'extrémité, avec une petite dent en dessous, et une rangée de cils blanchâtres, et très-serrés de chaque côté. Les jambes sont un peu arquées, avec une carène tranchante sur leur côté externe, et un ongle crochu à leur extrémité; elles ont de chaque côté une bordure de longs cils pâles. Les tarses sont courts, larges et plats, comme à l'ordinaire. — Ce singulier insecte a été trouvé à Dory, dans la Nouvelle-Guinée.

Nous avons représenté, figure 5 A, l'extrémité de son rostre, vu en dessous, pour montrer les mandibules et sa lèvre inférieure.

PRIONE DE LIMA. *Prionus (Mallodon Serv.) Limæ*. GUÉRIN. — *Castaneus, capite thoraceque rugosis; angulis posticis acutis, recurvis; lateribus serratis. Elytris basi rugosis; scutello cordato, longitudine impresso.* — L. 4 décim., l. 12 mill. — Atlas, Ins., pl. VII, fig. 1.

Il ressemble beaucoup au *Prionus faber* de notre pays; mais il est plus petit et moins large. Il est entièrement d'un brun marron, un peu plus foncé sur la tête et le corselet. Sa tête est assez petite, fortement rugueuse, avec une impression longitudinale et régulière au milieu. Les mandibules sont peu saillantes, bidentées au bout. Les palpes sont courts, inégaux, avec le dernier article tronqué obliquement. Les yeux sont grands, réniformes, plus rapprochés entre eux en dessous qu'en dessus. Les antennes de la seule femelle que nous possédions sont filiformes, à peine de la longueur de la moitié du corps. Le corselet est transversal, un peu plus large en arrière, presque deux fois aussi large que long, finement denticulé sur les bords latéraux, avec les angles postérieurs un peu prolongés et relevés en une petite pointe aplatie. Son bord antérieur est un peu échancré, garni de cils jaunes; le bord postérieur est sinueux, également bordé de cils de la même couleur; toute sa surface est assez plane, rugueuse, avec un sillon longitudinal et le milieu lisses. L'écusson est assez grand, finement rugueux, en forme de cœur, avec un sillon longitudinal au milieu; il est très-saillant et comme posé sur les élytres. La base des élytres est un peu plus large que le corselet; elles sont allongées, parallèles dans toute leur longueur, rebordées, arrondies en arrière, avec les épaules un peu saillantes et arrondies. Elles sont fortement rugueuses à leur base, mais ces rugosités deviennent plus fines vers la partie postérieure. On voit sur chaque élytre les traces de quatre côtes peu élevées et peu visibles; le dessous du thorax est garni de poils jaunâtres; l'abdomen en est tout-à-fait dépourvu; il est lisse, luisant, et se termine par un oviducte saillant, allongé, un peu élargi et tronqué au bout. Les pattes sont de longueur moyenne, comprimées, avec l'extrémité des jambes tronquée, un peu élargie et terminée par plusieurs petites épines peu saillantes. Les tarses sont peu dilatés, garnis de brosses jaunes en dessous. — Cet insecte a été pris à Lima.

DISTICHOCÈRE FERRUGINEUSE, *Distichocera ferruginea*. GUÉR.—*Corpus nigrum, subtus pilis argenteis nitidum. Capite macula frontali, thorace vittis duabus elytrisque dense piloso-ferrugineis.* — L. 22 mill., l. 6 m. $\frac{1}{2}$.

Cette belle espèce appartient évidemment au genre que Kirby a établi, dans les Transactions de la Société linnéenne de Londres, sous le nom de *Distichocère*. Sa tête est un peu allongée, rétrécie en avant, armée de deux courtes mandibules, avec les palpes maxillaires filiformes, noirs. Les yeux sont bruns, grands, réniformes. Les antennes s'insèrent dans une échancrure antérieure de ceux-ci; elles sont noires, un peu plus longues que la moitié du corps, avec les quatre premiers articles obconiques, et les suivants un peu plus larges, fourchus au bout, avec le dernier ovoïde allongé. La tête est entièrement noire, avec une large tache ferrugineuse sur le front, qui atteint de chaque côté la base des antennes et se prolonge en avant jusqu'au labre; cette tache est formée par un duvet court et très-serré. Le corselet est un peu plus large que long, tronqué carrément aux deux extrémités, arrondi et un peu sinué sur les côtés. Il est noir, avec le dessous garni d'un duvet blanc luisant; il a de chaque côté, en dessus, une large bande longitudinale formée par un duvet rouge. L'écusson est assez grand, arrondi,

