

# COLEOPTERORUM SPECIES

NOVAE AUT MINUS COGNITAE,  
DESCRIPTIONIBUS ILLUSTRATAE,

AUCTORE

E. F. GERMAR,

PHIL. DR. MINERAL. PROF.

---

CUM TAB. AEN. II.

---

H A L A E,  
IMPENSIS J. C. HENDELI ET FILII.

1 8 2 4.

<sup>c</sup>  
<sub>m</sub>  
**I N S E C T O R U M  
S P E C I E S**

**NOVAE AUT MINUS COGNITAE,  
DESCRIPTIONIBUS ILLUSTRATAE,**

**A U C T O R E**

**E. F. G E R M A R,**

**PHIL. DR. MINERAL. PROF.**

---

**VOLUMEN PRIMUM.**

**COLEOPTERA.**

---

**CUM TAB. AEN. 11.**

---

**H A L A E,  
IMPENSIS J. C. HENDELI ET FILII.**

**1 8 2 4.**

**(2 Thlr. 16 Gr.)**

.626) *LAMIA BICUSPIS*: thorace spina recurva armato, ferrugineus, helvo-tomentosus, elytris punctatis, laterè costatis, apice truncatis, extus spinosis, basi fasciculo piloso. Habitat in Brasilia.

Parva, magnitudine *L. fasciculatae*, sed latior. Caput subtiliter canaliculatum, cano tomentosum. Antennae ferrugineae, articulis apice obscurioribus. Thorax transversus, helvo-tomentosus, basi vage punctatus, lateribus infra medium spina recurva armatus. Coleoptera thorace paullo latiora, apicem versus parum angustata, lateribus deflexa, acute costata, apice truncata, angulo exteriorè spinoso, supra planiuscula, punctata, helvo-pubescentia, medio griseo-tomentosa, utrinque fasciculo piloso atro ante basin armata. Corpus subtus cum pedibus ferrugineum, glauco-pubescentia.

.627) *LAMIA JASPIDEA*: thorace spinoso, dorso carinato, binodoso, albo-tomentosa, elytris planiusculis, bicostatis, brunneo-bifasciatis, apice spinosis. Habitat in Brasilia.

Magnitudine fere *L. aedilis*. Caput obsolete canaliculatum, albo-tomentosum. Antennae corpore parum longiores, basi fuscae, apice albae, articulorum apicibus brunneis. Thorax transversus, vage punctatus, fusco-tomentosus, carinatus, tuberculis duobus dorsalibus inaequalis, lateribus acute spinosus. Coleoptera

ra

ra thorace basi latiora, apicem versus fensim angustata, supra planiuscula, costa utrinque media acuta et altera submarginali obsolete lineata, vage punctata, albo-tomentosa, fasciis duabus obliquis ad futuram abbreviatis brunneis, prima infra medium, secunda ante apicem; apice oblique truncata, angulo exteriori spinoso. Corpus subtus albido-tomentosum, pedibus nigro annulatis, tarsis anticis maris plumatis.

.628) *LAMIA SCOPIFERA*: thorace spinoso, dorso binodoso, fusco-tomentosa, antennis medio fasciculato-pilosis, elytris albo-fasciatis, atro-maculatis, apice rotundatis. Habitat in Brasilia.

Magnitudine *L. curculionoidis*, sed latior. Caput flavescens-griseum, tomentosum, maculis duabus occipitis atris. Antennae corpore vix longiores, fuscae, articulo tertio valde elongato, apice fasciculo piloso atro, articulis reliquis ferrugineis, apice atris. Thorax transversus, lateribus spinosus, dorso obtuse bituberculatus, fusco-tomentosus, cruce media atra. Coleoptera basi thorace latiora, et latitudine parum longiora, convexa, basi vage granulata, apice obtuse rotundata, fusco-tomentosa, fascia media alba, atro-punctata, apice nigro cincta, et dentes atris, albo terminatos versus apicem emittente. Praeterea fascia atra, obliqua,