

**ADICIONES A LA FAUNA ARGENTINA DE  
CERAMBYCIDAE (COLEOPTERA)**

***Phantazoderus frenatus* Fairm. et Germ., 1864  
(CERAMBYCINAE, BIMIID)**

**Nueva distribución:** Argentina, Río Negro, C. Bruch leg., 1 ej. (MACN).

**Distribución conocida:** Chile (Fairmaire et Germain, 1864; Blackwelder, 1945. *Bull. U. S. Nat. Mus., Washington D. C.*, 185: 550-763).

Esta Cerambycidae, de élitros negros alargados y bordes paralelos, de pronoto rojizo y de hábitos diurnos, en vuelo se confunde fácilmente con especies de *Pyraconema* Solier (Coleoptera: Lampyridae) (Barriga Tuñón, com. pers.). Estas poseen la misma coloración y probablemente tengan gusto desagradable como otras Lampyridae (Di Iorio, obs. pers.). La rareza de *Phantazoderus frenatus*, no sólo en las colecciones entomológicas sino también en el campo, podría deberse a la relación de densidad con su modelo, uno de los requisitos del mimetismo batesiano (Carpenter y Ford, 1949. Mimetismo. Con una sección sobre los aspectos genéticos del mimetismo. *Acme Agency Eds., Buenos Aires*).

El ejemplar de *Phantazoderus frenatus*, proveniente de Río Negro, constituye la primera cita para la fauna argentina de Cerambycidae. En dicha provincia también se encuentran *Pyraconema haemorrhoea* Fairm. et Germ., *P. obscura* Olivier y *P. vicina* Solier (Lampyridae), citadas por Bruch (1914. *Rev. Mus. La Plata*, 29 (2): 235-302), y presentes en Chile (Mc Dermott, 1960. *Proc. U. S. Nat. Mus., Washington*, 112: 133-157), con el mismo patrón de coloración descrito precedentemente, por lo que esta Cerambycidae podría tener varios modelos posibles, siguiendo la distribución geográfica de las especies de *Pyraconema*.

Oswaldo R. DI IORIO

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,  
Universidad de Buenos Aires.